

Landelijk Meetnet Vlinders

Mei 2012


Beste teller,

Eindelijk zijn de weergoden ons welgezind en is het prachtig telweer. Doordat het zo lang zo koud was, vliegen er ook nu nog steeds flink wat vlinders. We hopen dan ook dat de 'juni-dip' dit jaar niet heel diep zal zijn. Zo is er altijd wat te tellen.

Aantal getelde routes

Van tenminste 228 routes is inmiddels minimaal één telling online ingevoerd. En dat met zo'n slecht voorjaar, dat is geweldig.

Kijken we naar de dagen waarop geteld is dan zien we natuurlijk in april hopeloos veel slecht weer. Zelden kon op meer dan tien routes geteld worden en op enkele dagen zelfs helemaal niet. Dat veranderde tegen het eind van de maand en op Koninginnedag ging u massaal vlinders tellen. Het was dan ook prachtig weer en velen hadden natuurlijk ook vrij. De tellingen van de afgelopen dagen zijn nog niet allemaal ingevoerd, maar we zien dat er nu bijna elke dag flink wat routes geteld zijn.



Een opmerkelijke toename van de duinparelmoervlinder op Schiermonnikoog in 2008!

Kees van der Wal, teller op Schiermonnikoog, schreef dit stukje over de toestand van de duinparelmoervlinder op het eiland in 2008. Gezien de recente ontwikkeling leek het hem en ons leuk dit nu weer eens naar voren te halen.


"De duinparelmoer vlinder is heden ten dage bepaald geen algemene soort in Nederland op het eiland probeer ik hem al tientallen jaren te volgen. Op kleine fluctuaties na bleef de stand redelijk stabiel. Op goede vliegdagen telde men ongeveer 9 exemplaren op een teldag, in tegenstelling tot de grote parelmoervlinder die m.i. niet meer of nauwelijks nog voorkomt op Schiermonnikoog, wat de kleine parelmoervlinder betreft komt deze nog voor in kleine aantallen. Zoals bekend zijn vlinders goede indicatoren van een natuurgebied. Maar natuurgebieden kunnen veranderingen ondergaan waar je geen grip op hebt, bijvoorbeeld de konijnen ziekte V.H.S is aanwezig sinds 1998 (toen vond ik het



een exemplaar nabij vuurtoren), zure regen etc.. het proces van successie (plaatselijke verruiging) speelt al tientallen jaren, maar door de extreem lage konijnenstand, 10% is nog aanwezig en mogelijk zit ik nog aan de hoge kant, kan dit proces versneld plaatsvinden. Wat voor invloed heeft dit op o.a. vlinders, denk aan b.v. nectar en waardplanten. Schiermonnikoog is wat hogere planten betreft zeer soortenrijk, de waardplant duinviooltje *V.curtisii*, en het hondsviooltje *V.canina* kwamen o.a. in de Westerdunen veelvuldig voor (ei afzetting en voedsel voor de rupsen) ook de nectar planten spelen een cruciale rol in dit proces. Dit seizoen 2008 was zeer opmerkelijk! De valleien waar door Natuurmonumenten (gefaseerd) wordt gemaaid en deels worden vrijgesteld van bomen onder anderen berken, zag ik tot mijn verbazing op de kale jonkers (nectarplant) ongekend veel duinparelmoervlinders in een van de valleien telde ik 92 exemplaren eind juni! in andere valleien het zelfde verhaal waar ook de kale jonker in stroken bloeiden. Vanwaar deze piek, het is mogelijk dat een vooruitgang of achteruitgang meestal wordt veroorzaakt door verschillende factoren die invloed hebben op de populatie dynamica. Deze prachtige vlinders zijn het waard om ze te volgen en te koesteren en zorgvuldig mee om te gaan in zoverre als men daar positieve invloed op uit kan oefenen.

Ps. Tot 2011 is de trend op een lichte fluctuatie na gelijk gebleven."

Gemiddeld aantal vlinders per telling




De grafiek laat het gemiddeld aantal vlinders per telling zien over de periode 1990-2011 en vergelijkt dat met dit jaar. Ondanks het slechte telweer lag het aantal vlinders nauwelijks onder het langjarig gemiddelde. Het was dus slecht telweer, maar de vlinders waren er wel gewoon.

Rectificatie artikel Meetnet in meinummer Vlinders

In het meinummer van het tijdschrift Vlinders is in het artikel Meetnet Vlinders - Vroeg, vroeger, vroegst een verkeerde grafiek geplaatst.

De rij vlinders is in de verkeerde volgorde in het tijdschrift terechtgekomen. De kleine vos bijvoorbeeld is, zoals in het artikel staat juist eerder gaan vliegen en de kommavlinder later. Dat staat in de grafiek andersom. Hieronder staat de juiste grafiek.



Soortgerichte routes

Als u een soortgerichte vlinderroute loopt, wilt u minstens drie keer tellen in de top van de vliegtijd. De verwachte vliegtijden zijn te vinden op

<http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169>. U kunt voor veel soorten ook kijken per regio. Door het koele voorjaar zullen veel soorten naar verwachting later vliegen dan de afgelopen jaren. Maar uw eigen waarnemingen zijn het belangrijkste. Ga daarom eens kijken of er al vlinders vliegen op uw route.

Dit zijn de verwachtingen voor de piek van de vliegtijden komende maand:

bosparelmoevlinder	26 juni – 5 juli
veenhooibeestje	27 juni – 3 juli
duinparelmoevlinder	29 juni - 18 juli
kleine ijsvogelvlinder	3 juli - 18 juli

Wilt u ook uw ervaring delen met andere tellers?

Heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers? Wij ontvangen graag uw verhaal. Stuur het naar meetnetten@vlinderstichting.nl.

Contact

Mocht u contact met ons willen, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen.

Landelijk Meetnet Vlinders

Chris van Swaay

José Kok, Kars Veling en Kim Huskens

Tel.: 0317 467346

meetnetten@vlinderstichting.nl

Deze nieuwsbrief wordt via email verstuurd aan alle tellers van het Landelijk Meetnet Vlinders. Mocht u geen prijs stellen op de nieuwsbrief, dan kunt u de verzending stoppen door op meetnet.vlinderstichting.nl bij Instellingen de optie Nieuwsbrief abonnement op nee te zetten.