


Uiltjes met lichte aders




Donkere vormen van **Maansikkeluil** (*Agrochola lunosa*) zijn vaak grijsachtig, hebben donkere invulling van nier- en ringvlek en zwarte stipjes tegen golflijn. Geen tapvlek. Sept-okt. Algemeen.

Tekst: Wim Veraghtert
Foto's: Jos Van de Ven, Marc Herremans, Leo Janssen & Jurriën Van Deijk.



Gelijnde grasuil
Tholera decimalis

- Binnenste dwarslijn duikt naar onder nabij binnenrand
- Pijlvlekjes bij golflijn
- Antennes bij ♂♂ geveerd
- Borststuk: kraag met bleke rand
- Vliegtijd: aug-sept; vrij zeldz.



Splinterstreep
Naenia typica

- Binnenste dwarslijn vrij regelmatig & ± recht
- Geen pijlvlekjes bij golflijn
- Antennes bij ♂♂ niet geveerd
- Borststuk zonder opv. kraag
- Vliegtijd: jun-aug; zeldz.



Gelijnde silene-uil
Sideridis reticulata

- Binnenste dwarslijn duikt naar onder nabij binnenrand
- Pijlvlekjes bij golflijn
- Antennes bij ♂♂ niet geveerd
- Borststuk soms opv. gekraagd
- Vliegtijd: mei-jul; zeer zeldz.