


Beheerkaart Eikenhakhout



Hoog Buurlo

Verantwoordelijke organisatie: Staatsbosbeheer
Eikenhakhout aanwezig?: Ja
Belangrijkste doelsoorten: Hazelworm
Levendbarende hagedis
Bospareelmoervlinder
Hengel
Vliegend hert



Beheerkaart Eikenhakhout

Eikenhakhoutbeheer bij Hoog Buurlo

Locatie X: Hier heeft grootschalig hakhout herstel plaatsgevonden. Binnen dit perceel moeten enkele takkenhopen blijven liggen. Deze functioneren inmiddels als schuilplaats voor reptielen en andere kleine dieren. Op enkele plekken mag de grond worden verstoord om planten beter te laten kiemen. Veel takken moeten nog worden uitgesleept, hierbij moet rekening worden gehouden met de lage stobben. Op korte termijn moet op deze locatie de overwoekerende Amerikaanse vogelkers worden weggehaald omdat deze dan teveel licht wegnemen. Er kunnen enkele nieuwe eikjes bijgezet worden om een betere dichtheid in het hakhout te krijgen.

Het is aan te bevelen in de aansluitende bosrand enkele inhammen te creëren, zo ontstaat meer structuur en een geleidelijke overgang naar het eikenbos. De aansluitende akker **minstens 1 x per jaar (eind september)** gefaseerd maaien en afvoeren ter bevordering van de ontwikkeling van nectarplanten en doelsoorten. Een insectenstrook is aan te bevelen.



Vliegend hert heeft ondergronds dood eikenhout nodig. Bij voorkeur op een plek met een zuidelijke expositie. Enkele **knoteiken** aan een zuidrand worden sterk aanbevolen. Zo ontstaan op den duur vanzelf ondergronds rottende delen in de vorm van bijvoorbeeld oude wortels.

Locatie A: Hier ligt een perceel eikenhakhout dat moet worden afgezet. Dit moet gefaseerd gebeuren in min. 3 fasen, waarbij tussen de kapcycli een faseverschil van 3 jaar komt. Hierdoor wordt de aanwezige natuurwaarde behouden en komt er meer leeftijdsverschil in het perceel. Een enkele (max. 10 / ha) oudere eik kan blijven staan. Andere boomsoorten beperken.

Verruiging en overwoekering moet worden voorkomen. Op enkele plaatsen mag de grond wat braak worden gelegd, wat zeer gunstig is voor kiemende planten. Na het afzetten van de eikjes, zullen enkele nieuwe eiken moeten worden bijgeplaatst. Gezien de hoge wilddruk moet het perceel worden afgerasterd. Het is aan te bevelen in de aansluitende bosrand enkele inhammen te creëren, zo ontstaat meer structuur en een geleidelijke overgang naar het bos.

Op een enkele plek, met voorkeur in de inhammen van de aansluitende bosrand kunnen takkenhopen worden geplaatst om braam te stimuleren. Dit is een belangrijke nectarplant. Net als composieten en kruiskruiden. (zoveel mogelijk sparen).

! Pas op met het uithalen van het hout!
Afgezette stobben worden makkelijk beschadigd.