

Hakhoutperceel Mander

Op 6 augustus heb ik even kort het perceel bij Mander kunnen bezoeken. Ik was vooral benieuwd naar de ontwikkeling van het afgezette deel.

Biodiversiteit

Er liggen veel potenties en ik trof al snel eikenpage, citroenvlinder, boomblauwtje en gehakelde aurelia aan. Dit zijn typische soorten van bosranden en mantelzones. Ook vlogen diverse paardenbijters en heidelibellen rond. De weersomstandigheden waren niet optimaal, maar knopsprietje, ratelaar en bruine sprinkhaan werden wel gehoord. Qua bloemen groeit er veel rankende helmbloem en her en der wilde kamperfoelie. Ook vingerhoedskruid, melkdistels stonden op dit moment in bloei. Pijpenstrootje is dominant in het perceel en gaat over in struikheide buiten het perceel.



Figuur 1: De lichtminnende rankende helmbloem staat veel in het perceel

Sommige eiken lopen goed uit en zijn niet aangevreten. (figuur 2). Er zijn ook veel eiken wel aangevreten door de reeën en de uitloop tot flinke 'struik' duurt daarom wat langer, maar is nog steeds goed in ontwikkeling. Ook is een deel van de eiken afgevallen omdat ze niet uitlopen. Er zijn nog veel kale plekken, maar jonge uitschieters van ongewenste opslag gebruiken deze plekken om uit te lopen.



Figuur 2: Goed uitlopende eik in het perceel

Belangrijker is de opslag van vuilboom, adelaarsvaren en Amerikaanse vogelkers. Deze houden het licht weg bij de stobben, waardoor de eiken moeite hebben met uitlopen (figuur 3 en 4). Het opschieten van vuilboom of vogelskers direct naast een eikenstobbe zie je veel. Het kan zijn dat dit in de winter voor bescherming zorgt tegen de reeën. Maar zodra de eikenuitlopers lang genoeg, zal er ruimte gemaakt moeten worden (figuur 5).



Figuur 3: Veel opslag van vogelkers, varens en vuilboom nemen het licht op de stobben weg



Figuur 4: Onder de opslag liggen ongeveer twintig stobben verscholen. Op de voorgrond vingerhoedskruid, geschikte nectarbron voor hommels.



Figuur 5: Links: uitlopende eik met direct daarnaast een Am. vogelkers. Recht:, vogelkers zal de eik snel licht wegnemen.

Conclusie:

Het hakhoutperceel heeft veel potentie. De biodiversiteit zal toegenomen zijn. Dit zou concreter onderzocht moeten worden (2012). In ieder geval zijn doelsoorten wilde kamperfoelie en levendbarende hagedis aangetroffen.

De opslag zal moeten worden verwijderd. Om tot meer succes te komen. Deze zal indien geen actie wordt ondernomen de komende twee jaar een cruciale negatieve wending geven in de ontwikkeling van de eiken.

Gezien de huidige ontwikkeling is uitbreiding van het perceel niet wenselijk, dit zou ten koste gaan van het potentieel leefgebied voor de kleine ijsvogelvlinder.

Aanbeveling:

Het verdient de aanbeveling:

- aan de hakhoutbrigade om komend seizoen twee sessies te wijden aan het verwijderen van de opslag
- verdere uitbreiding van het hakhoutperceel beperken
- in 2012 gericht onderzoek te doen naar de biodiversiteit
- om een aantal jonge eiken bij te planten